会長		担当理事		会計	

保政第１５７－２号
令和３年４月２７日

郡市医師会長　各位

埼玉県保健医療部長　関本建二

新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について

本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、厚生労働省健康局健康課予防接種室から標記について周知依頼がありました。

つきましては、別添のとおり送付いたしますので、貴会の会員に御周知いただきますようお願いいたします。

ワクチン接種後に副反応を疑う症状で患者が相談した際の対応に当たり、留意すべき事項について記載されておりますので、御承知おきください。

なお、Ａグループ病院及びＢグループ病院、連携型施設、サテライト型接種施設には県、市町村から速やかに周知します。

担　当　新型コロナウイルスワクチンチーム
電　話　０４８－８３０－７５０６
メール　a3510-22@pref.saitama.lg.jp

埼加八潮医師会 収受 3.4.28 第142号

事　務　連　絡
令和３年４月21日

各 (都道府県 / 市町村 / 特別区) 衛生主管部（局）　御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室
新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）の住民への接種の実施に当たり、今後、新型コロナワクチン接種後の発熱等の副反応を疑う症状について、被接種者が受診を希望する際には、まず、接種した医療機関や、かかりつけの医療機関等に相談することが想定されます。

今般、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状で患者が相談した際の対応に当たって、医療機関等にご留意いただきたい事項について、以下のとおりお示ししますので、管内の関係団体及び医療機関に周知いただくよう、お願いいたします。

記

○　新型コロナワクチン接種後に起こりやすい症状の頻度等について

約２万人の新型コロナワクチンの被接種者を対象として実施した「先行接種者健康調査」の中間報告において、別紙の通り、接種後に生じた症状の頻度等が報告されています。新型コロナワクチン接種後に患者から電話相談があった際の対応に当たって、参考にしていただくようお願いします。

なお、当該中間報告については、厚生労働省の以下のウェブサイトにてお示ししており、今後の分析結果についても当該サイトにお示しする予定です。

※厚生労働省ウェブサイト「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa.html

○　新型コロナワクチン接種後の発熱等の症状への対応について

新型コロナワクチン接種後に発熱等の症状で患者から電話相談があった際に、新型コロナウイルス感染症を含む、他の疾病との鑑別が必要になることが考え

られます。先行接種者健康調査において得られている知見（※）を参考に、以下のような状況に応じた対応をお願いいたします。

・新型コロナワクチン接種の副反応による症状については必要に応じ解熱鎮痛剤等による症状の緩和を図る。
・症状が継続する場合や新型コロナワクチンの副反応としては典型的でない症状がみられる場合には他の疾病を考慮して対応する。
・とりわけ、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には必要な検査を実施する、又は検査を実施できる医療機関を紹介する。

（※）先行接種者健康調査の中間報告において得られた、他の疾患との鑑別に当たって参考になる可能性のある知見

・新型コロナワクチン接種後に、発熱・頭痛・倦怠感の症状は、１回目の接種後よりも２回目の接種後の方が高い頻度で報告されている。
・新型コロナワクチン接種後の発熱は、接種後翌日までに起こることが多く、その多くは２日間以内に解熱している。
・新型コロナウイルス感染症の症状として報告されている、咳や息切れ等の呼吸器症状や、味覚障害・嗅覚障害は、新型コロナワクチン接種後の症状としてはほとんど報告されていない。

令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）


新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）

課題番号　20HA2013

第55回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和３年度第１回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）
2021(令和３)年４月９日

資料2より一部抜粋

別紙



CDC　　国立感染症研究所ホームページ

健康観察日誌集計の中間報告（3）

代表研究者
伊藤 澄信　順天堂大学医学部　臨床研究・治験センター、臨床薬理学　客員教授
分担研究者
楠 進　地域医療機能推進機構・本部・理事
土田 尚　国立病院機構本部総合研究センター　治験研究部長
金子 善博　労働者健康安全機構本部本部　研究ディレクター
飛田 護邦　順天堂大学革新的医療技術開発研究センター 先任准教授
研究事務局
順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研究・治験センター


予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会＆医薬品等安全対策部会安全対策調査会　2021/4/9
4月13日修正版


順天堂大学　コロナワクチン研究事務局

新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）

発熱（37.5℃以上）

Data Cutoff Date 2021/4/7 24:00





順天堂大学　コロナワクチン研究事務局


新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）

接種部位反応 ①

Data Cutoff Date 2021/4/7 24:00


1回目接種後

n=19,157(96.7%)



2回目接種後

n=15,985(80.7%)



新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）


接種部位反応 ②

Data Cutoff Date 2021/4/7 24:00


1回目接種後

n=19,157(96.7%)


疼痛



熱感





かゆみ




2回目接種後

n=15,985(80.7%)







新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）


全身反応

Data Cutoff Date 2021/4/7 24:00


1回目接種後

n=19,157(96.7%)


頭痛



倦怠感



鼻水



2回目接種後

n=15,985(80.7%)

